


AMADEUS 77



Variedad de frijol
rojo brillante
de excelente rendimiento y
buena adaptación

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: tipo arbolito, guía corta, con carga en la parte media
- Zona recomendada: zonas bajas e intermedias
- Rendimiento promedio: 27 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo brillante, largo y arriñonado
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 6-7
- Distancia entre surco: 40 - 60 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 36 - 38
- Días a madurez: 66 - 68
- Días a cosecha: 70 - 75
- Cantidad de semilla: 65 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común y mosaico dorado amarillo, tolerante a estrés por sequía y al picudo de la vaina.

CARDENAL



Variedad de frijol
rojo claro brillante
de alto rendimiento y
buena adaptación

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: tipo arbolito, de crecimiento arbustivo indeterminado
- Zona recomendada: valles y altiplanos
- Rendimiento promedio: 28 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo claro brillante y ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5-6
- Distancia entre surco: 40 - 60 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 36 - 38
- Días a madurez: 68 - 70
- Días a cosecha: 65 - 70
- Cantidad de semilla: 65 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común y mosaico dorado amarillo, tolerante a mustia hilachosa y roya.

CARRIZALITO



Variedad de frijol
rojo retinto
de alto rendimiento y
buena adaptación

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: tipo arbolito, guía corta, con carga en la parte media
- Zona recomendada: zonas intermedias de Centro América
- Rendimiento promedio: 35 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo tinto y ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5-6
- Distancia entre surco: 40 - 60 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 35 - 37
- Días a madurez: 68 - 70
- Días a cosecha: 70 - 75
- Cantidad de semilla: 65 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común y mosaico dorado amarillo, tolerante a sequía y al picudo de la vaina.

DEORHO



**Variedad de frijol
rojo claro
de alto rendimiento y amplia
adaptación a ambientes diversos**

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: arbustivo indeterminado de guía intermedia
- Zona recomendada: valles, altiplanos y laderas
- Rendimiento promedio: 32 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo claro brillante y ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 6-7
- Distancia entre surco: 40 - 60 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 37 - 39
- Días a madurez: 68 - 70
- Días a cosecha: 70 - 80
- Cantidad de semilla: 60 - 75 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común y mosaico dorado amarillo, tolerante a mancha angular, mustia hilachosa, roya, sequía, alta temperatura y baja fertilidad.

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

TIO CANELA 75



Variedad de frijol
rojo corriente
de alto rendimiento y estabilidad
tolerante al calor y sequía

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: tipo arbolito, compacto, poca guía
- Zona recomendada: bajas e intermedias
- Rendimiento promedio: 27 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo corriente, pequeño y alargado
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 6-7
- Distancia entre surco: 40 - 50 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 37 - 39
- Días a madurez: 68 - 70
- Días a cosecha: 70 - 80
- Cantidad de semilla: 65 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común, al mosaico dorado amarillo, tolerancia intermedia a roya y antracnosis.

PARAISITO MEJORADO 2



PM2-DON REY

Variedad de frijol rojo
claro brillante, tipo criollo
amplia adaptación agronómica
y excelente valor comercial

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: semicompacta , vigorosa, guía corta, intermedia
- Zona recomendada: altiplanos, laderas y valles
- Rendimiento promedio: 27 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo claro brillante, tipo criollo, ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5- 6
- Distancia entre surco: 40 - 60 cm
- Semilla por metro lineal: 8 - 12 semillas
- Días a floración: 36 - 38
- Días a madurez: 65 - 70
- Días a cosecha: 70 - 75
- Cantidad de semilla: 65 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común, tolerancia intermedia al mosaico dorado amarillo ,bacteriosis común y roya.

HONDURAS NUTRITIVO



Variedad de frijol
rojo claro brillante
CON HIERRO

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: erecta, con carga en la parte media
- Zona recomendada: valles y altiplanos
- Rendimiento promedio: 25 - 35 qq/mz
- Color y tipo de grano: rojo claro brillante, arriñonado
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5 - 6
- Distancia entre surco: 50 cm
- Semilla por metro lineal: 10 semillas
- Días a floración: 38 - 40
- Días a madurez: 66 - 68
- Días a cosecha: 75 - 80
- Cantidad de semilla: 60 - 75 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común, tolerancia intermedia al mosaico dorado amarillo, bacteriosis común y roya.

AZABACHE 40



Variedad de frijol negro
de alto rendimiento y estabilidad
tolerante al calor y sequía

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: erecta, con carga en la parte media
- Zona recomendada: valles, altiplanos y laderas
- Rendimiento promedio: 35 - 40 qq/mz
- Color y tipo de grano: negro opaco, pequeño, ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5 - 7
- Distancia entre surco: 50 cm
- Semilla por metro lineal: 10 semillas
- Días a floración: 38 - 42
- Días a madurez: 70 - 75
- Días a cosecha: 76 - 80
- Cantidad de semilla: 60 - 65 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común, y común necrótico, tolerancia intermedia al mosaico dorado amarillo mustia hilachosa, roya y bacteriosis común.

LENCA PRECOZ



Variedad de frijol negro
de cosecha rápida
tolerante a enfermedades

Características agronómicas

- Arquitectura de la planta: erecta, con carga en la parte media
- Zona recomendada: valles, altiplanos y laderas
- Rendimiento promedio: 30 - 35 qq/mz
- Color y tipo de grano: negro opaco, ovoide
- Color de la vaina a cosecha: crema
- Número de granos por vaina: 5 - 6
- Distancia entre surco: 50 cm
- Semilla por metro lineal: 10 semillas
- Días a floración: 32 - 35
- Días a madurez: 62 - 66
- Días a cosecha: 60 - 70
- Cantidad de semilla: 60 - 70 lb/mz
- Enfermedades: resistente al mosaico común, mosaico dorado amarillo y común necrótico, tolerancia intermedia a mustia hilachosa, royá y bacteriosis común.